

दांतों की निकासी के लिए संकेत

पेरिओडॉन्टल रोग

क्षय

पेरिअपिक्ल संक्रमण

कटाव

घर्षण

उदासीनता

हयपोप्लासिया

पुलपल घाव

दांतों का इलाज

कृत्रिम उपचार

निकासी के बारे में मिथक

दाढ़ दांत की निकासी दृष्टि का नुकसान होता है

दांतों की निकासी के लिए आसन्न दांतों की गतिशीलता की ओर जाता है.

दांतों की निकासी सामान्यीकृत शरीर में कमजोरी की ओर जाता है

पोस्ट निकालना निर्देश

रोगी सॉकेट पर धुंध दबाव पैक जगह है और आदेश में किसी भी नकसीर जो उत्पन्न हो सकती है गिरफ्तारी के लिए मैं 1 घंटे के लिए मजबूती से इस पर काटने चाहिए।

रोगी दिन के बाकी समय थूके नहीं

रोगी पोस्ट ऑपरेशन रक्तस्राव के जोखिम को कम करने के लिए जोरदार मुंह धोने, हिंसक व्यायाम, उत्तेजक या बहुत गर्म भोजन या दिन के आराम के लिए पीने से बचना चाहिए

एक्सट्राऑरल बर्फ सेंक किया जाना चाहिए

रोगी अगले 24 घंटे के लिए मुलायम और ठंड आहार लेने की सलाह दी है।

रोगी दवा नियमित रूप से आदेश द्वारा निर्धारित लेना चाहिए।

गर्म खारा पानी की प्रचुर मात्रा के रूप में संभव के रूप में अक्सर मुंह में ले लिया है और यथासंभव लंबे समय के निष्कर्षण के अगले दिन से निकासी की साइट पर आयोजित किया जाना चाहिए।

स्थानीय संज्ञाहरण के उपयोग के बाद होंठ, जीभ या गाल दो या तीन घंटे के दौरान जो वे शायद काटने से क्षतिग्रस्त लिए सुन्न रह सकती है। मरीज को इस खतरे की चेतावनी दी जानी चाहिए।

सूखा सॉकेट

स्थानीयकृत ओस्टिअटिस एक तीव्रता से दर्दनाक दांत नंगे हड्डी और टूट खून का थक्का युक्त सॉकेट से होती है। उपचार के उद्देश्य के दर्द और संकल्प की तेजी के राहत होना चाहिए, सॉकेट गर्म सामान्य नमक और सभी डेजेनेरेटिंग खून का थक्का हटा साथ सिंचित किया जाना चाहिए। तेज बोनी स्पर्स संदंश के साथ या तो एक्ससाइज़्ड है या एक पहिया पत्थर के साथ चिकनी चाहिए। एक ढीला जिंक आक्साइड और रूई पर लॉग के तेल से बना ड्रेसिंग सॉकेट में टुकड़ है। एनाल्जेसिक गोलियाँ और गर्म खारा मुंह रीन्सेस निर्धारित कर रहे हैं।